


Recommended Well Child Visits and Vaccines

Well visits and vaccines help your child stay healthy, happy and ready for the next adventure.

American Academy of Pediatrics (AAP) schedule of doctor visits and vaccines for your child at each age.



Birth to 1 year

At birth	Hep B (Hepatitis B – in hospital)
2 to 5 days	Well baby visit (no vaccine)
1 month	Well baby visit (no vaccine)
0-2 months	Hep B (Hepatitis B), DTaP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), PCV (Pneumo), Hib (Haemophilus Influenza Type B), Polio (IPV), and Rotavirus
4 months	DTaP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), PCV (Pneumo), Hib (Haemophilus Influenza Type B), Polio (IPV), and Rotavirus
6 months	DTaP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), PCV (Pneumo), Hib (Haemophilus Influenza Type B), Polio (IPV), Hep B (Hepatitis B), Rotavirus , and the flu vaccine *
9 months	Well baby visit: Hgb (hemoglobin) checked (no vaccine)
12 months	Blood lead screening MMR (Measles, Mumps and Rubella), Varicella (Chicken Pox), and Hep A (Hepatitis A)

Toddler years 15 months to 4 years

15 months	DTaP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), Hib (Haemophilus Influenza Type B), and PCV (Pneumo)
18 months	Hep A (Hepatitis A)
2-3 years	Annual well child visit, possible blood lead screening
4 years	DTaP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), Polio (IPV), MMR (Measles/ Mumps/ Rubella), and Varicella (Chicken Pox)

5 to 12 years

5-8 years	Annual well child visit
9-10 years	HPV (2-dose series of vaccines)
11-12 years	Tdap (Tetanus/ Diphtheria/ Acellular Pertussis) and Meningococcal ACWY , HPV (if not done previously)

Teen years 13 to 18 years

13-15 years	Annual well child visit
16 years	Meningococcal B (2 doses) and Meningococcal ACWY (Meningitis)
17-18 years	Annual well child visit

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends all infants under 8 months old receive a dose of nirsevimab to prevent severe RSV disease. It also recommends the COVID-19 vaccination for ages 6 months and older. Some children cannot be vaccinated for certain diseases due to medical conditions and body responses. Please speak with a pediatrician to see what's right for your child.

* Children six months and older should receive annual flu shots during the fall season.



Visitas de control y vacunas recomendadas para niños sanos

Las visitas de control y las vacunas ayudan a que su hijo se mantenga saludable, feliz y listo para la próxima aventura.



Calendario de visitas al médico y vacunas para su hijo según la American Academy of Pediatrics (AAP).

Desde el nacimiento hasta 1 año

- Al nacer** **Hep B** (Hepatitis B - en el hospital)
- 2 a 5 días** Visita de control del bebé sano (sin vacuna)
- 1 mes** Visita de control del bebé sano (sin vacuna)
- 0-2 meses** **Hep B** (Hepatitis B), **DTaP** (Difteria, Tétanos, Tos ferina), **PCV** (neumo), **Hib** (Haemophilus influenzae Tipo B), **Polio** (IPV) y **Rotavirus**
- 4 meses** **DTaP** (Difteria, Tétanos, Tos ferina), **PCV** (neumo), **Hib** (Haemophilus Influenza Tipo B), **Polio** (IPV) y **Rotavirus**
- 6 meses** **DTaP** (difteria, tétanos, tos ferina), **PCV** (neumococo), **Hib** (Haemophilus influenzae tipo B), **Polio** (IPV), **Hep B** (Hepatitis B), **Rotavirus** y la **vacuna contra la gripe***
- 9 meses** Visita de bebé sano: **Hgb** (hemoglobina) comprobado (sin vacuna)
- 12 meses** Prueba de detección de plomo en sangre **MMR** (sarampión, paperas y rubéola), **varicela** y **Hep A** (Hepatitis A)

Años de infancia 15 meses a 4 años

- 15 meses** **DTaP** (difteria, tétanos, tos ferina), **Hib** (Haemophilus influenzae tipo B) y **PCV** (neumo)
- 18 meses** **Hep A** (Hepatitis A)
- 2-3 años** Visita anual de niño sano, posible prueba de detección de plomo en sangre
- 4 años** **DTaP** (difteria, tétanos, tos ferina), **polio** (IPV), **MMR** (sarampión/paperas/rubéola) y **varicela**

5 a 12 años

- 5-8 años** Visita anual de niño sano
- 9-10 años** **VPH** (serie de vacunas de 2 dosis)
- 11-12 años** **Tdap** (tétanos/difteria/tos ferina acelular) y **meningococo ACWY**, **VPH** (si no se realizó previamente)

Años de adolescencia 13 a 18 años

- 13-15 años** Visita anual de niño sano
- 16 años** **Meningococo B** (2 dosis) y **Meningococo ACWY** (Meningitis)
- 17-18 años** Visita anual de niño sano

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomiendan que todos los bebés menores de 8 meses reciban una dosis de nirsevimab para prevenir la enfermedad grave por VSR. También recomienda la vacunación contra la COVID-19 a partir de los 6 meses de edad. Algunos niños no pueden ser vacunados contra ciertas enfermedades debido a condiciones médicas y respuestas corporales. Hable con un pediatra para ver qué es lo mejor para su hijo.

* Los niños de seis meses o más deben recibir la vacuna anual contra la gripe durante la temporada de otoño.

